

Non seulement la vache donne du lait, mais elle est aussi un animal de troupeau et mange du fourrage grossier



Les vaches s'arrangent bien entre elles à la condition que la vache de rang inférieur cède la place à celle d'un rang supérieur.

ou de tête et – si la vache d'un rang inférieur ne s'écarte pas suffisamment rapidement – aussi des coups dans le ventre ou dans la tétine, ce qui n'arrive pas souvent dans une pâture. C'est pourquoi beaucoup d'agriculteurs écornent les vaches déjà comme veaux. Lorsqu'une stabulation libre est bien conçue, on peut se dispenser de procéder à l'écornage, ainsi que le prouve la pratique. Il faut surtout éviter les impasses et les couloirs étroits. Le problème des confrontations se pose moins dans les étables à l'attache. En effet, le fait d'attacher les vaches empêche le comportement social naturel de ces animaux de troupeau.



On parle du confort des vaches lorsqu'elles donnent davantage de lait. On oublie alors leur façon de vivre, qui n'est pas en relation directe avec la production de lait.

Les bovins s'entendent bien entre eux dans la pâture où il disposent de suffisamment de place. La règle est la suivante: «la vache qui est d'un rang inférieur doit laisser la place à celle qui est d'un rang supérieur». La distance individuelle ou distance d'évitement est en règle générale d'environ 3 mètres; elle est plus grande chez les vaches à cornes que chez les vaches qui ont été écornées. A l'étable, une vache de rang inférieur ne cède pas sans autre la place à une vache de rang supérieur. Il peut s'ensuivre de forts coups de cornes

Les vaches se déplacent ...

Pendant qu'elles broutent, les vaches se déplacent en avançant lentement et recherchent les bons endroits des prairies. Dans cette recherche de nourriture, elles parcourent souvent plusieurs kilomètres par jour. Dans une étable à l'attache, les vaches ne peuvent se déplacer que lorsqu'on leur permet de sortir dans la prairie ou


La hiérarchie s'établit par des combats. Le rang d'une vache ou d'une génisse dépend de l'âge, de la stature et de la grandeur.



La vache est un animal de prairie. Entre les périodes de pâture, elle se couche et rumine.



Un matelas de paille bien entretenu garantit une couche propre et tendre.



dans un parcours. Surtout en hiver, elles doivent rester longtemps à l'attache. Par contre, en stabulation libre, elles peuvent se déplacer toute la journée. Si, de plus, en été, elles peuvent jouir de la prairie et en hiver d'un parcours, elles ont beaucoup de mouvement et de l'air frais. Ces deux facteurs exercent une influence positive sur la production laitière ainsi que sur la santé des animaux. La stabulation libre est aussi avantageuse pour le détenteur du bétail, vu qu'il est alors dispensé d'attacher et de détacher les animaux, par exemple.

... elles aiment se coucher à des endroits tendres ...

Sur le pâturage, les vaches préfèrent les endroits tendres pour se coucher. A l'étable, il arrive que des inflammations des jarrets se produisent sur des couches en caoutchouc dur, avec une litière insuffisamment épaisse. Les vaches se couchent alors moins et restent plus longtemps debout. Il s'ensuit souvent une diminution de la production laitière, car environ 80% de la rumination s'effectue lorsque la vache est couchée, et la circulation sanguine dans la tétine chez une vache couchée est de 30% supérieure à celle chez la vache debout. Celui qui veut agir en faveur de ces vaches veille à ce qu'elles disposent d'une couche tendre, sèche et propre, par exemple au moyen d'un matelas de paille bien entretenu.

... elles veulent manger sans être dérangées ...

Au pâturage, les vaches mangent spontanément jusqu'à 12 heures par jour. Elles disposent alors de beaucoup de place et de temps. A l'étable, elles entrent souvent en concurrence lors de l'affouragement. Elles n'ont pas toujours une nourriture d'égale qualité et les vaches doivent se tenir les unes proches des autres lorsqu'elles mangent. Pour qu'une vache de rang inférieur puisse éviter une vache de rang supérieur, il faut davantage de postes d'affouragement que d'animaux dans l'étable. Les cornadis autobloquants

Le cornadis autobloquant se ferme lorsque la vache y introduit la tête. Dans le cornadis palissade, la vache enfle la tête par-dessus; il convient aux vaches encornées.

ne conviennent pas tous. Pour les vaches avec des cornes, il ne faut employer que les cornadis en palissades, dans lesquels la tête peut être enfilée par-dessus.

... elles ont besoin de soins corporels ...

Lorsqu'on observe des vaches ou des génisses dans une prairie ou dans une stabulation libre, on constate qu'elles se grattent volontiers à des troncs d'arbres ou se lèchent. Fréquemment, les vaches lèchent les autres au cou ou à une autre partie du corps qu'elles ne peuvent atteindre elles-mêmes. Pour atteindre le ventre ou une partie postérieure, elles tournent la tête vers l'arrière et ne se tiennent debout que sur trois jambes. Pour qu'elles ne glissent pas en stabulation, le sol doit être antidérapant.

Lorsqu'en stabulation libre, les animaux ne sont pas attachés, ils peuvent en tout temps facilement se gratter et se lécher. Les vaches apprécient les brosses pour se gratter et les poteaux pour se frotter. Les vaches à l'attache peuvent à peine tourner la tête vers l'arrière ou se gratter à un objet solide. De plus, le dresse-vache électrique sur le dos rend difficiles les soins corporels. C'est pourquoi dans une étable à l'attache, le détenteur doit assumer une partie des soins corporels en étrillant les animaux chaque jour.

... les vaches ont besoin de contacts «personnalisés»...

Un observateur attentif constate que les animaux entretiennent des relations personnelles entre eux. Des recherches récentes le confirment. On parle alors de relations animales. Il existe des relations étroites entre les mères et leurs filles. Mais aussi entre les humains et les animaux peuvent s'instaurer des relations d'amitié. Un bon soigneur prend du temps pour ses animaux; il est amical envers eux, leur parle, les flatte et les caresse. Il jouit de la confiance de ses animaux et de meilleurs contacts que ceux de celui qui leur fait peur. De bonnes relations entre les humains et les animaux n'ont pas seulement des résultats positifs à l'étable, mais agissent aussi sur le bien-être des gens et des bêtes.

Un bon contact entre les humains et les animaux facilite les relations avec les animaux.



Lorsque la vache veut se lécher à l'arrière, elle doit fortement tourner la tête et ne se tient que sur trois jambes. Il lui faut alors un sol antidérapant.



La langue de la vache n'atteint pas toutes les parties du corps.



... elles sont sensibles à la chaleur ...

Les vaches supportent relativement bien le froid, à la condition qu'elles soient en bonne santé, qu'elles soient habituées au froid et qu'elles soient bien nourries. C'est seulement à partir d'une température de -15°C qu'elles ont besoin d'une énergie complémentaire. Elles se sentent à l'aise aussi longtemps qu'elles disposent d'un abri contre les courants d'air, d'une couche sèche avec une bonne litière. Par contre, des températures supérieures à 25°C engendrent rapidement un stress de chaleur, principalement chez les vaches qui ont une haute production laitière. La production laitière provoque une hausse de la température du corps. En été, les vaches et les génisses ont besoin de places ombrées sur les pâturages ou doivent être, en cas de grosse chaleur, rentrées à l'étable. Dans les étables exposées à la température extérieure, les toits doivent être isolés contre les rayons du soleil.



Un pâturage devrait disposer de places d'ombre.

... avant une naissance, elles s'isolent du troupeau ...

Dans la nature, une vache portante près de son terme s'isole du troupeau un ou deux jours avant la mise bas et recherche un endroit approprié quelque peu éloigné du troupeau. Lorsque le veau est né, sa mère le lèche. Celui-ci tète sa mère déjà dans les premières heures après sa naissance. Il s'établit une étroite relation entre la mère et le veau.



Il y a moins de troubles du comportement chez les veaux qui peuvent téter leur mère.

Un box de mise bas spacieux et séparé permet à la vache, même dans une étable, de mettre au monde son veau dans la tranquillité. La constitution de cette relation mère-veau n'est plus possible dans l'économie laitière moderne, vu que le veau est enlevé à la mère peu après sa naissance. Cela est calculé, vu qu'il est beaucoup plus difficile de séparer le veau de sa mère lorsque cette relation s'est établie. Cependant, le manque de cette relation semble être la cause de troubles du comportement. Chez de tels veaux, il arrive fréquemment que les jeunes bovins se mettent à téter leurs congénères. Ce trouble du comportement pourrait peut-être être évité par le «Dairy Ranching» en usage dans les pays peu industrialisés: on traite la vache, mais le veau peut aussi téter sa mère.

... elles doivent être habituées aux humains ...

Les vaches dans les étables à l'attache sont assujetties aux humains et sont habituées à être conduites. Il en est autrement en stabulation libre: les animaux n'y sont encore enfermés que pour manger; ils sont exceptionnellement attachés et conduits au licol. Lors de la désalpe, les bouviers se plaignent toujours plus souvent de ce que les jeunes animaux de stabulation libre soient toujours plus difficiles à attraper et à être chargés dans des camions. Afin que les vaches qui ont l'habitude d'être libres s'habituent au contact des humains, il faut que les veaux soient régulièrement et les génisses occasionnellement mis à l'attache et conduits. A ce point de vue, la stabulation libre occasionne davantage de travail que la stabulation à l'attache.

Il faut accepter des limites à l'élevage de rendement

Celui qui possède des animaux devrait les soigner convenablement. Les animaux se portent alors mieux et les vaches donnent davantage de lait. De plus, le propriétaire a davantage de satisfaction dans son travail. Pourtant, de bons soins ne suffisent pas à eux seuls. L'élevage et l'affouragement ont une grande influence sur le bien-être et la productivité des animaux. Alors que les vaches, il y a 40 ans, donnaient environ 4000 kilos de lait par année, on en est actuellement presque à 8000 kilos. Cette augmentation de la productivité a été avant tout possible grâce à beaucoup de compléments énergétiques dans l'alimentation. Les vaches sont spontanément des utilisatrices de fourrage grossier. Les grandes quantités de compléments alimentaires sont liées à certains dangers, comme, par exemple, une hyperacidité de la panse. L'éleveur conscient de ses responsabilités sait reconnaître les limites à l'élevage de rendement.

Des recherches récentes et des expériences tirées de la pratique indiquent que le détention intensive en pâturage peut aussi être rentable sous nos conditions. Il ne s'agit pas d'obtenir avant tout une haute production laitière, mais une production laitière au prorata du nombre d'hectares de prairie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 14 kilos de lait par hectare pour 340 kilos de compléments alimentaires par hectare.

Adresses utiles

- (1) Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Centre spécialisé dans la détention convenable des ruminants et des porcs, Agroscope FAT Tänikon, 3856 Ettenhausen, tél. 052 368 33 77, www.blv.admin.ch, rubriques Animaux, Protection des animaux, Détention des animaux de rente, InformationZTHT@agroscope.admin.ch
- (2) Service sanitaire des bovins RGD, 8315 Lindau, tél. 052 347 17 55, www.rgd.ch
- (3) Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com > Publications > Animaux de rente

Indications littéraires

Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux adresses ci-dessus

- Liste des publications de la recherche en protection des animaux (1)
- Directives de l'Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour la détention des bovins (1)

Rapports FAT (1):

- Concernant les matelas de paille: nos 416 et 529
- Indications de structures pour les étables en boxes avec parcours: n° 508
- Feuilles d'information de la Protection Suisse des Animaux PSA (3)
(désignation avec chiffres et lettres)
 - Bovins en libre-parcours (1.2 soins et entretien aux animaux)
(disponible seulement en allemand)
 - Râteliers pour bovins (TSE 1)
 - Stabulation libre pour vaches encornées (TSE 7)
 - Recouvrement de sols tendres et antidérapants (TSE 8)

Auteur, Photos

Michael Götz, Dr Ing. Agr., M. Goetz journaliste agricole indépendant SARL, Säntisstrasse 2a, 9034 Eggersriet SG, Tél. 071 877 22 29, migoetz@paus.ch, www.agrarjournalist.ch

Editeur et renseignements supplémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle,
tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3,
psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous
www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_rente