

Non seulement les poules pondent des œufs, mais elles peuvent aussi voler... si on les laisse faire

Nos poules domestiques élevées pour leur rendement ont encore en elles le comportement de leurs ancêtres sauvages: les poules de la jungle vivant en Asie du Sud-Est, les poules Bankiva. La domestication n'a pas éliminé ce comportement naturel et les poules sont souvent surdomestiquées.

Les poules sauvages vivent en petits groupes, presque en harems, avec un coq, plusieurs poules et poulettes. Elles se tiennent sur un territoire relativement restreint de 70 à 80 mètres de diamètre autour d'un arbre leur servant de dortoir. Le rôle du coq ne consiste pas seulement à cocher ses poules, mais aussi à être le chef du troupeau de poules et à le protéger. Il indique aux poules les endroits où se trouve de la nourriture; il accompagne les poules pondeuses au nid, où elles déposent leurs œufs; il va les rechercher ensuite pour les ramener au groupe.

Les poules d'un groupe se connaissent les unes les autres. Selon divers facteurs, comme l'âge, la grandeur de la crête, ou la conscience de son importance, il se forme une hiérarchie qui est à la base de la bonne entente entre les poules. Sans hiérarchie, il y aurait toujours des querelles et des troubles parmi le groupe, ce qui constituerait une inutile perte d'énergie!

Dans un poulailler, de nos jours, souvent plusieurs milliers de poules sont rassemblées. Dans des volières avec une vue d'ensemble, bien structurées et divisées, il se forme des sous-groupes de 10 à 20 poules. Elles ne se tiennent pas seulement de préférence dans leur propre domaine, mais font des excursions journalières de reconnaissance à travers poulailler et parcours.

Les poules volent ...

La plupart du temps, les poules se tiennent sur le sol du poulailler durant la journée, mais en cas de danger ou pour se reposer, elles volent sur des éléments élevés, sur des arbres. Les poulaillers-volières correspondent à ce comportement naturel. Les poules peuvent se tenir sur plusieurs étages et recherchent les perchoirs élevés. Une détention bienveillante envers les animaux comprend aussi un jardin d'hiver couvert (parcours en cas de mauvais temps) et une prairie.



M. GÖTZ


En volière, les poules utilisent les trois dimensions. Elles peuvent voleter et se percher.

... Elles grattent le sol ...

Les poules se nourrissent de plusieurs façons: elles mangent de tout. Leur menu ne consiste pas seulement en baies, graines et pousses, mais aussi en vers et en insectes. Elles recherchent leur nourriture principalement au sol et dans le sol. Gratter et creuser sont des mouvements typiques. A l'exception d'une sieste à midi, la plus grande partie de la journée se passe à rechercher de la nourriture. Pour que les poules puissent aussi gratter en poulailler, le sol doit avoir une épaisseur de 5 à 10 centimètres avec de la paille ou d'autres matériaux meubles comme litière.

... Elles prennent des bains de soleil et de poussière ...

Lorsqu'on observe des poules en liberté, on remarque, surtout en hiver et au printemps, qu'elles s'exposent au soleil avec les ailes étendues. On remarque ces bains de soleil chez beaucoup d'espèces d'oiseaux. Les rayons du soleil ne réchauffent pas seulement les animaux, mais ils les protègent aussi à l'égard des maladies, vu que les rayons ultraviolets tuent les bactéries nuisibles. La lumière est aussi importante pour la synthèse de la vitamine D. Les poules ne s'exposent pas seulement au soleil, mais elles prennent aussi des bains de poussière; elles creusent alors une cuvette dans la terre ou dans la litière; elles s'y couchent et grattent de la poussière dont elles aspergent leur plumage. Cette poussière lie la graisse en excès et elle sert de protection contre les parasites incommodants, comme les poux et les araignées. Le jardin d'hiver d'un poulailler se prête bien à ces bains de soleil et de poussière.



M. GÖTZ

Dans un jardin d'hiver couvert, les poules peuvent picorer, gratter, jouir de bains de poussière et de soleil.



H.U. HUBER

Rien de tel qu'un bain de poussière!



M. GÖTZ

Les poules se déplacent volontiers le long de couverts, par exemple de buissons, de haies ou de roseaux de Chine.



M. GÖTZ

Les poules ont besoin de protections contre les rapaces.

... Elles recherchent un couvert ...

Les poules sauvages se trouvent surtout dans les forêts avec clairière et dans les environs des buissons. La poule n'aime pas les surfaces non protégées où elle peut facilement devenir la proie d'un rapace. Nos poules domestiques n'apprécient donc pas beaucoup les prairies les plus belles s'il y manque des arbres, des buissons ou des protections artificielles.

... Elles déposent leurs œufs dans un endroit abrité ...

Dans la nature, les poules pondent des œufs pour les couvrir ensuite. La poule pondeuse recherche un endroit abrité, à l'écart du groupe, et le rembourre d'un peu d'herbe et de feuilles pour en faire un nid tendre. Chaque jour ou chaque deuxième jour, la poule pond un œuf dans le nid durant les heures matinales, jusqu'à 6 à 8 œufs. Parfois, d'autres poules y glissent des œufs. La poule pondeuse couve ses œufs durant 21 jours et quitte brièvement le nid chaque jour pour se nourrir, boire et prendre un bain de poussière; elle retourne ses œufs à intervalles réguliers. Lorsque les poussins sont sortis de l'œuf, la mère en prend soin. Elle prend les poussins sous ses ailes. A l'âge d'environ 3 semaines, les jeunes peuvent si bien voler qu'ils passent les nuits dès lors sur un arbre avec leur mère, à la façon des volailles.

Dans la détention moderne des pondeuses, elles sont élevées de sorte qu'elles pondent presque un œuf par jour. Les œufs à couvrir – au contraire des œufs de consommation – sont produits par des parents spécialement choisis. La couvaison de ces œufs est effectuée de nos jours d'une façon standard dans des couveuses sophistiquées. Ces couvaisons artificielles étaient déjà connues des Romains. Les poussins, après l'éclosion, se développent sans mère, dans des locaux chauffés. Même lorsque les pondeuses ne couvent plus elles-mêmes les œufs, elles ont besoin de nids isolés ou de groupes, protégés et légèrement obscurcis. Pour pondre, elle préfèrent les nids de paille ou de balles de céréales. Si le nid ne plaît pas à la poule, elle pond ses œufs dans la litière, ce qui non seulement salit ou casse les œufs, mais donne davantage de travail au soigneur.



H.U. HUBER

Les poules déposent leurs œufs dans un endroit protégé. Elles préfèrent les nids avec de la litière.

Les volailles d'engrais sont aussi des poules

Depuis environ 50 ans, on fait une distinction entre la détention des pondeuses pour la production des œufs et celle des poules d'engrais pour la production de viande. Les pondeuses sont généralement abattues à un an et demi, après qu'elles ont pondu environ 300 œufs. Vu que l'élevage des poussins mâles de races pondeuses n'est pas rentable, ils sont mis à mort à l'âge d'un jour. L'existence des volailles d'engrais dont l'élevage est très poussé finit à l'âge de tout juste 6 semaines. Durant cette courte durée, elles s'accroissent du poussin duveteux d'un jour de 50 grammes à un poulet de 1,6 kilo, surtout avec développement de la poitrine et des cuisses.

Les volailles d'engrais ont aussi le droit de manger et de boire comme les autres poules; elles veulent gratter dans la litière et prendre des bains de poussière. Elles aiment les possibilités de se percher sur des objets élevés, lorsque ceux-ci sont facilement accessibles. Le problème des volailles d'engrais à croissance rapide est un élevage dirigé sur le développement extrêmement rapide de la viande de la poitrine. Il se produit souvent des défaillances circulatoires et de douloureuses modifications du squelette des pattes. Certains animaux poussés à l'engraissement ne peuvent se déplacer qu'avec peine. Ils restent immobiles la plus grande partie du jour, ce qui est totalement atypique pour de jeunes animaux. La mise à mort des poussins mâles, aussi bien que l'élevage des races poussées à l'engraissement et à croissance extrêmement rapide, posent des problèmes d'éthique et de protection des animaux.



KAGFREILAND

Les volailles d'engrais aussi apprécient une prairie.

KAGFREILAND



Les poules d'engrais sont souvent trop poussées; à gauche, jeune poulet; à droite, jeune poulet à croissance rapide (les deux âgés de 28 jours!).

Le marché de la volaille offre des poules d'engrais et à croissance normale qui sont prêtes à l'abattage à l'âge de 8 à 11 semaines après un nourrissage intensif. Ces races sont beaucoup plus robustes que les volailles d'engrais super-sélectionnées dont jusqu'à 4% périssent durant l'engraissement. Pour la détention en liberté, seules les races d'engrais à croissance lente conviennent à la détention en liberté. Sont à recommander les programmes des labels Bio, Bourgeon, Coop, Naturaplan ou Kagfreiland, qui tiennent compte de ces problèmes et contribuent à ce que les poules ne soient pas sur-exploitées.

Adresses utiles

- (1) Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com
www.protection-animaux.com > Publications > Animaux de rente
- (2) Kagfreiland, Engelgasse 12A, 9001 St-Gall, tél. 071 222 18 18, www.kagfreiland.ch
- (3) Aviforum (autrefois Ecole suisse de l'élevage des volailles, SGS), Burgerweg 22, 3052 Zollikofen, tél. 031 915 35 35, www.aviforum.ch
- (4) Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Centre pour l'élevage correct: volailles et lapins (ZTHZ)
Burgerweg 22, 3052 Zollikofen, tél. 031 915 35 35, www.blv.admin.ch, rubrique Animaux, Protection des animaux, Détention des animaux de rente, InformationZTHT@agroscope.admin.ch
- (5) Union suisse des éleveurs de volailles de race (SRGV), Burgerweg 24, 3052 Zollikofen, tél. 031 911 01 27
- (6) Institut de recherche pour l'agriculture biologique (FiBL), Ackerstrasse, 5070 Frick, tél. 062 865 72 72, www.fibl.org, rubrique FiBL Shop

Indications littéraires

Les chiffres entre parenthèses se rapportent aux adresses ci-dessus

- Liste des publications de la recherche en protection des animaux (4)
- Diverses directives et feuilles d'information de l'Office fédérale de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (4)
- Feuilles d'information du FiBL pour les poules pondeuses et la détention des volailles d'engrais (6)
- Feuilles d'information de la Protection Suisse des Animaux PSA (1)
 - Stabulation en volière avec jardin d'hiver, aire d'exercice et pâturage (TKS 6.1)
 - Poulailier avec perchoirs et pâturage (TKS 6.2)
 - Le poulailier mobile (TKS 6.3)
 - Il est interdit de couper le bec (6.1 soins et entretien aux animaux)

Remerciements

La PSA remercie Mme Nadja Brodmann Weber de Kagfreiland, de l'Organisation suisse pour la protection des animaux de rente, pour sa collaboration.

Auteur

Michael Götz, Dr Ing. Agr., M. Goetz journaliste agricole indépendant SARL, Säntisstrasse 2a, 9034 Eggersriet SG, Tél. 071 877 22 29, migoetz@paus.ch, www.agrarjournalist.ch

Editeur et renseignements supplémentaires

Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle, tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3, psa@protection-animaux.com, www.protection-animaux.com

Cette feuille d'information et d'autres sont disponibles au téléchargement sous www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_rente